

Collier insecticide BIOCANIPRO pour grand chien

Composition

Dimpylate 6,3 g - Excipient q.s.p. 1 collier de 42 g.

Présentation

Boîte de 1 sachet de 1 collier : A.M.M. n° FR/V/8992714 6/2013.
N°GTIN : 03700481502020

Indications

Affections à parasites sensibles au dimpylate. Elimination des puces et des tiques et prévention des nouvelles infestations par les puces pendant 300 jours et par les tiques pendant 200 jours.

Voie d'administration

Usage externe.

Posologie

1 collier par animal. Ajuster la longueur du collier de manière à pouvoir passer un doigt entre le cou et le collier. Couper le bout de collier en excès.

Contre-indications

En l'absence de données disponibles, ne pas appliquer sur les chiots de moins de 3 mois. Ne pas utiliser sur un animal malade ou convalescent ou présentant des lésions cutanées.

Mises en garde particulières

Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Enlever le collier dès les premiers signes d'intolérance.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Enlever le collier si le chien est baigné ou lavé et le remettre lorsque le poil est sec. L'efficacité du collier peut être réduite si le poil est mouillé de façon répétée et significative (pluie, bain). Dans ce cas, le collier doit être changé plus précocement.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Se laver les mains après avoir fixé le collier autour du cou de l'animal. Ne pas fumer, boire ou

manger pendant la pose du collier.

Eviter le contact avec la peau.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Ne pas laisser les enfants jouer avec le collier.

Effets indésirables

Une irritation peut apparaître au niveau du cou de l'animal du fait du port du collier. Dans ce cas, ôter le collier jusqu'à disparition des symptômes. Des effets indésirables ont été observés chez le chien : principalement vomissements, tremblements voire convulsions. Le traitement est symptomatique et éliminatoire.

Utilisation en cas de grossesse ou de lactation

L'utilisation chez la femelle gestante ou allaitante est déconseillée.

Interactions médicamenteuses

Ne pas utiliser d'autres insecticides organophosphorés sur l'animal tant que celui-ci porte le collier.

Surdosage

Les principaux symptômes observés lors d'une intoxication accidentelle par les insecticides organophosphorés sont une hypersalivation, une diarrhée, un encombrement bronchique, des tremblements et des convulsions. Le traitement d'une intoxication accidentelle repose essentiellement sur l'administration de sulfate d'atropine.

Précautions particulières de conservation

A conserver dans l'emballage extérieur d'origine. A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

NE PAS FAIRE AVALER. USAGE VETERINAIRE.