

Laxatif biocanina

Laxatif par voie orale pour chiens et chats

Composition qualitative et quantitative

Docusate de sodium : 30 mg

Lauryl sulfate de sodium : 30 mg

Excipient q.s.p. 1 comprimé enrobé de 260 mg Colorant E 131

A.M.M. n° FR/V/0048193 1/1989

présentation

Boîte de 30 comprimés enrobés

N°GTIN : 03661729237879

Indications

Traitement des constipations et stases intestinales chez les chiens et les chats.

Propriétés

Le LAXATIF BIOCANINA provoque un afflux d'eau dans le tube digestif et un renforcement des contractions intestinales. Il permet aussi, grâce à ses propriétés tensio-actives, de désagréger les matières fécales durcies, les boules de poil, les amas de fragments d'os... Il peut donc être utilisé en cas de constipation aiguë ou chronique ou de coprostase, d'obstruction intestinale par des amas d'os et contre les obstructions intestinales dues aux boules de poils chez le chat.

Posologie et mode d'emploi

Voie d'administration : orale.

- Constipation chronique : pendant plusieurs jours et jusqu'à reprise d'un transit normal :
 - Chats et petits chiens : 1 comprimé le matin à jeun
 - Chiens moyens : 2 comprimés le matin à jeun
 - Gros chiens : 4 comprimés le matin à jeun.
-
- Constipation aiguë : trois jours de suite en laissant l'animal à la diète :
 - Chats et petits chiens : 1 comprimé matin et soir
 - Chiens moyens et gros chiens : 2 comprimés matin, midi et soir.

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'occlusion intestinale.

Précautions particulières d'emploi

Mises en garde particulières à chaque espèce cible

En présence d'une constipation opiniâtre, et surtout en présence de vomissements répétés, il est nécessaire d'arrêter le traitement et de consulter un vétérinaire.

Le régime alimentaire des animaux constipés doit comporter un supplément de légumes verts non féculents, et être complètement dépourvu d'os quels qu'ils soient.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Administrer avec prudence chez les animaux atteints d'ulcères gastriques, de nausées ou de vomissements.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

En cas d'ingestion accidentelle, consulter un médecin.

Surdosage

Des diarrhées peuvent être observées en cas de surdosage.

Conseil Biocanina

Dans l'intérêt de vos animaux, supprimez tous les os qu'ils pourraient ingérer et entretenez régulièrement leur pelage avec les SHAMPOOINGS D'HYGIÈNE BIOCANINA.

Consultez un vétérinaire

Si la constipation persiste, il peut s'agir d'une pathologie autre :

- Affections au niveau du côlon : tumeur, mégacôlon, polype...
- Maladies ano-rectales
- Pathologie iatrogène : diurétiques, anti-convulsivants...
- Dysendocrinies.