

Poudre antiparasitaire à la tétraméthrine pour chien Setric

Poudre insecticide antiparasitaire pour chiens

Composition qualitative et quantitative

Tétraméthrine : 2,2 mg

Excipients q.s.p. 1 g

A.M.M. n° FR/V/8898475 5/1984

Présentation

Poudre pour application cutanée.

Flacon poudreur de 150 g

N°GTIN : 03420900100636

Indications

Chez les chiens : traitement des infestations par les puces, les poux et les tiques.

Propriétés

La tétraméthrine, molécule de la famille des pyréthrinoïdes, se caractérise par son activité insecticide et acaricide. La molécule agit par contact, en bloquant la transmission de l'influx nerveux chez les insectes. Ces effets sont attribués à des variations de la perméabilité membranaire des axones, aux ions sodium et potassium.

Posologie et mode d'emploi

Usage externe uniquement.

Par voie cutanée : 1 g de poudre par kg de poids corporel ce qui correspond à 15 g de poudre pour un animal de 15 kg.

Appliquez la poudre sur le pelage, en évitant les yeux et le museau, tout en brossant la fourrure à rebrousse poil pour faire pénétrer le produit. Brossez ensuite le pelage pour faire tomber l'excédent de poudre.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez un animal malade ou convalescent ou présentant des lésions cutanées étendues.

Effets indésirables

Des effets indésirables ont été observés : léthargie, anorexie, hypersalivation, tremblements et ataxie.

Mises en garde particulières

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Eviter le contact de la poudre avec les yeux ou la gueule de l'animal. En cas de contact fortuit rincer abondamment à l'eau.

Ne pas mélanger avec la nourriture.

Ne pas utiliser chez les chiots de moins de 2 mois.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Se laver les mains après utilisation.

Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application.

En cas d'exposition accidentelle avec les yeux, rincer à l'eau avec soin.

Utiliser dans un local bien aéré, de préférence à l'extérieur.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Autres précautions

La tétraméthrine peut avoir un effet toxique sur les organismes aquatiques. Ne pas laisser les chiens se baigner dans des cours d'eau dans les jours qui suivent l'application du produit.

Utilisation en cas de gravidité ou de lactation

Utilisation en cas de gravidité ou de lactation Les études de laboratoire sur la tétraméthrine n'ont pas mis en évidence d'effets tératogènes ou embryotoxiques. Cependant, l'innocuité n'a pas été établie chez les espèces cibles pendant la gestation et la lactation. L'utilisation du produit en cas de gravidité ou de lactation ne doit se faire qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque établi par le vétérinaire.

Interactions médicamenteuses et autres

Ne pas utiliser simultanément d'autres insecticides de la famille des pyréthriinoïdes.

Surdosage

Les signes d'intoxication sont tremblement, faiblesse musculaire, hypersécrétion, détresse respiratoire. En cas d'apparition de troubles nerveux, procéder à un lavage à l'eau tiède et au savon pour éliminer les restes du produit. Le traitement est symptomatique.

Remarques

Si les risques de réinfestation sont importants, on complétera le traitement avec :

- sur l'animal : TICK-PUSS chien
- sur l'habitat : [ÉCO-LOGIS FOGGER](#) pour les locaux fermés.

[ÉCO-LOGIS SPRAY](#) pour les objets et surfaces situés à l'air libre, qui nécessitent des applications répétées ou qui ne sont pas atteints par le produit nébulisé.

[ÉCO-LOGIS PARETHRINE](#) : contre blattes, fourmis, moustiques, araignées...