

COLLIER DIMPYLATE CHIEN BIOCANIPRO

1. DESCRIPTION

a. Indications

Affections à parasites sensibles au dimpylate.

Chez les chiens :

- Elimination des puces et des tiques
- Prévention des nouvelles infestations par les puces et les tiques.

L'efficacité du collier persiste pendant 300 jours contre les puces et 200 jours contre les tiques.

b. Composition qualitative et quantitative

Un collier de 30 g contient :

Substance(s) active(s) :

Dimpylate 4,5 g

2. CONSEILS D'UTILISATION

a. Posologie et voie d'administration

Usage externe.

Un collier par animal.

Ajuster la longueur du collier de manière à pouvoir passer un doigt entre le cou et le collier. Couper le bout de collier en excès.

b. Contre-indications

En l'absence de données disponibles, ne pas appliquer sur les chiots de moins de trois mois.

Ne pas utiliser sur un animal malade ou convalescent ou présentant des lésions cutanées.

3. PRECAUTIONS D'EMPLOI

a. Précautions particulières d'emploi chez l'animal

Enlever le collier si le chien est baigné ou lavé et le remettre lorsque le poil est sec. L'efficacité du collier peut être réduite si le poil est mouillé de façon répétée et significative (pluie, bain). Dans ce cas, le collier doit être changé plus précocement.

b. Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Se laver les mains après avoir fixé le collier autour du cou de l'animal. Ne pas fumer, boire ou manger pendant la pose du collier. Eviter le contact avec la peau. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas laisser les enfants jouer avec le collier.

4. AUTRES INFORMATIONS

a. Présentation

Boîte de 1 sachet de 1 collier

b. Renvoi Med vet

Ce produit est un médicament vétérinaire. Lire attentivement la notice. Pour plus d'informations, retrouvez la fiche produit complète :

<http://med-vet.fr/medicament-collier-dimpylate-biocanipro-chat-chien-grand-p2580>