

# FIPROCAT 50 MG SOLUTION SPOT-ON POUR CHATS

## 1. DESCRIPTION

### a. Indications

Chez les chats :

Traitement des infestations par les puces (*Ctenocephalides* spp.).

L'efficacité insecticide prévient de toute nouvelle infestation par les puces pendant 4 semaines.

Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP), lorsque ce diagnostic a été posé par un vétérinaire.

Bien qu'une efficacité acaricide immédiate n'a pas été démontrée pour ce produit, une activité acaricide persistante jusqu'à une semaine a été démontrée contre les tiques *Ixodes ricinus*.

Si des tiques *Ixodes ricinus* sont déjà présentes lors de l'application du médicament, toutes les tiques peuvent ne pas être tuées dans les premières 48 heures mais elles peuvent l'être en une semaine.

### b. Composition

Une pipette de 0,5 mL contient :

Substance(s) active(s) :

Fipronil .....50,00 mg

Excipient(s) :

Butylhydroxyanisole (E 320) ..... 0,10 mg

Butylhydroxytoluène (E 321) ..... 0,05 mg

## 2. CONSEILS D'UTILISATION

### a. Posologie et voie d'administration

Voie d'administration et dosage :

Pour application locale sur la peau uniquement. A usage externe exclusivement.

Une pipette de 0,5 mL permet le traitement d'un chat, ce qui correspond à une dose minimale recommandée de 5 mg de fipronil par kg de poids corporel.

L'intervalle minimum entre deux applications ne doit pas être inférieur à 4 semaines.

### b. Mode d'emploi

Pour une application en toute sécurité :

Détacher l'une des alvéoles de la plaquette. Cela permet d'éviter l'ouverture accidentelle du reste de la plaquette qui protège les pipettes encore non entamées de l'humidité. Ouvrir l'alvéole avec des ciseaux. Pour ne pas endommager la pipette, couper en suivant la ligne marquée par une paire de ciseaux. Retirer délicatement la feuille aluminium à partir de l'extrémité découpée et sortir la pipette.

Tenir la pipette à la verticale. Tapoter légèrement la pipette pour faire descendre tout le contenu liquide dans le corps de la pipette. Rabattre la partie située au-dessus de la pipette vers l'arrière. La pipette peut maintenant être inclinée, si nécessaire. Pour ouvrir la pipette, rompre son embout en le pliant d'un coup sec au niveau du trait prédécoupé.

Ecarter les poils entre les omoplates de telle façon que la peau soit visible. Placer l'embout de la pipette sur la peau et presser la pipette à plusieurs reprises pour la vider entièrement de son contenu directement sur la peau et en un seul point.

L'application de la solution à proximité de la base de la tête permet de limiter le risque que l'animal lèche la solution. Veiller à ce que les animaux ne se lèchent pas entre eux après le traitement.

On veillera à éviter de trop mouiller le pelage avec le produit, car il en résulterait un aspect de poils collants à l'endroit traité. Si tel était cependant le cas, cet aspect disparaîtrait dans les 24 heures suivant l'application.

#### **c. Contre-indications :**

- Ne pas utiliser chez les chatons âgés de moins de 8 semaines et/ou d'un poids inférieur à 1 kg, en l'absence de données disponibles.
- Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladie systémique, fièvre, etc.) ou convalescents.
- Ne pas utiliser chez les lapins car des effets indésirables parfois létaux pourraient survenir.
- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

### **3. PRECAUTIONS D'EMPLOI**

#### **a. Précautions particulières d'emploi chez l'animal**

Il est important de s'assurer que le produit est appliqué sur une zone où l'animal ne peut pas se lécher.

Veiller à ce que les animaux qui viennent d'être traités ne se lèchent pas entre eux. Eviter tout contact avec les yeux de l'animal. En cas de contact accidentel du médicament vétérinaire avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau.

Ne pas appliquer le médicament vétérinaire sur des plaies ou des lésions cutanées.

Il est possible que quelques tiques restent accrochées. Le risque de transmission de maladies infectieuses ne peut donc pas être totalement exclu si les conditions sont défavorables.

### **b. Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux**

Ce produit peut provoquer une irritation des muqueuses et des yeux. En conséquence, tout contact du produit avec la bouche et les yeux doit être évité.

En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Si l'irritation oculaire persiste, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquetage.

Eviter tout contact avec les doigts. En cas de contact, laver immédiatement les doigts à l'eau et au savon.

Se laver les mains après usage. Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application du produit.

Les personnes présentant une hypersensibilité connue au fipronil ou à l'un des excipients doivent éviter tout contact avec ce médicament vétérinaire.

Ne pas manipuler les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le site d'application soit sec. Il est donc recommandé de ne pas traiter les animaux pendant la journée mais plutôt en début de soirée. De plus, il est conseillé de ne pas laisser les animaux traités dormir avec leurs maîtres, en particulier les enfants.

Conserver les pipettes dans l'emballage d'origine et jeter immédiatement les pipettes utilisées.

### **c. Autres précautions**

Le produit peut avoir des effets néfastes sur les surfaces peintes, vernies ou d'autres surfaces domestiques ou les meubles.

## **4. AUTRES INFORMATIONS**

### **a. Présentation**

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes de 0,5 mL

### **b. Renvoi med vet**

Ce produit est un médicament vétérinaire. Lire attentivement la notice. Pour plus d'informations, retrouvez la fiche produit complète :

<http://med-vet.fr/medicament-Fiprocat%20Fiprodog-p3264>